

GENOTIPO		SIN CIRROSIS	CON CIRROSIS COMPENSADA
1b	PREF	EBR/GZR 12 sem (AI) ^{a,b} LDV/SOF 12 sem (AI), 8 sem en naïve y CV<6 mill UI/ml (AII) OBV/PTV/rtv+DSV 12 sem (AI) ^b SOF+DCV 12 sem (AI) SOF+SMV 12 sem (AI) ^b SOF/VEL 12 sem (AI) ^a	EBR/GZR 12 sem (AI) ^{a,b} LDV/SOF 12 sem en naïve (AI) OBV/PTV/rtv+DSV 12 sem (AI) ^b SOF/VEL 12 sem (AI) ^a
	ALT		LDV/SOF+RBV 12 sem en no respondedores, 24 sem en intolerantes a RBV (AI) SOF+DCV+RBV 12 sem (BII) SOF+SMV+RBV 12 sem (BII) ^b
1a	PREF	EBR/GZR 12 sem sin factores desfavorables de respuesta (AI) ^{a,b,c} LDV/SOF 12 sem (AI), 8 sem en naïve y CV<6 mill UI/ml (AII) SOF+SMV 12 sem (AI) ^b SOF/VEL 12 sem (AI) ^a	EBR/GZR 12 sem en pacientes sin factores desfavorables de respuesta (AI) ^{a,b,c} LDV/SOF 12 sem en naïve (AI) SOF/VEL 12 sem (AI) ^a
	ALT	EBR/GZR+RBV 16 sem con factores desfavorables de respuesta (AI) ^{a,b,c} OBV/PTV/rtv+DSV+RBV 12 sem (AI) ^b SOF+DCV 12 sem (BI)	EBR/GZR+RBV 16 sem con factores desfavorables de respuesta (AI) ^{a,b,c} LDV/SOF+RBV 12 sem en no respondedores, 24 sem en intolerantes a RBV (AI) OBV/PTV/rtv+DSV+RBV 12 sem en naïve y recaedores, 24 sem en no respondedores (AI) ^b SOF+DCV+RBV 12 sem (AII) SOF+SMV+RBV 12 sem si no tiene Q80K (AII) ^b
1a/1b FALLO TEL/BOC	PREF	EBR/GZR+RBV 12 sem (AI), 16 sem con factores desfavorables de respuesta (BIII) ^{a,b,c} LDV/SOF+/-RBV 12 sem (AI), 24 sem en intolerantes a RBV (AI) SOF/VEL 12 sem (AI)	
2	PREF	SOF/VEL 12 sem (AI) ^a	SOF/VEL 12 sem (BIII) ^a
	ALT	SOF+DCV 12 sem (AI) SOF+RBV 12 sem (AI)	SOF+DCV 12 sem (AI) SOF+RBV 16 sem (BII)
No respondedores a PR o SOF+RBV: SOF/VEL* 12 sem (AI)			
3	PREF	SOF+DCV 12 sem (AI) SOF/VEL 12 sem (AI) ^a	SOF/VEL 12 sem (AI) ^a
	ALT		SOF+DCV+RBV 12 sem (AI) SOF+DCV+/-RBV 24 sem (BI)
4	PREF	EBR/GZR 12 sem sin factores desfavorables de respuesta (AI) ^{a,b,c} , EBR/GZR+RBV 16 sem con factores desfavorables de respuesta (AI) ^{a,b,c} LDV/SOF 12 sem (BII) OBV/PTV/rtv+RBV 12 sem (AI) ^b SOF+DCV+/-RBV 12 sem (BII) SOF+SMV 12 sem (AI) SOF/VEL 12 sem (AI) ^a	EBR/GZR 12 sem sin factores desfavorables de respuesta (AI) ^{a,b,c} EBR/GZR+RBV 16 sem con factores desfavorables de respuesta (AI) ^{a,b,c} LDV/SOF + RBV 12 sem (BII) OBV/PTV/rtv+RBV 12 sem (AI) ^b SOF+DCV+RBV 12 sem, 24 sem en intolerantes a RBV (BI) SOF+SMV+RBV 12 sem (BII) ^b SOF/VEL 12 sem (AI) ^a
5 y 6	PREF	LDV/SOF 12 sem (AI) SOF/VEL 12 sem (AI) ^a	
	ALT	SOF+DCV 12 sem (BI)	

^a Cuando se encuentre disponible

^b No Se puede administrar en Child B ni C

^c Factores desfavorables: Genotipo 1a, VAR basales a Elbasvir, No respondedores, Cirrosis